

- ISOTHÉRAPIE DU VACCIN (5 - 7)
1 dose 10 000K, 1 dose 1 000K, 1 dose 200K à 15 jours d'intervalle.

Supplément pour les vaccins modernes (aux OGM)

Alterner sur 3 jours :

- AXINITE élixir minéral (3) : 10 gouttes au coucher
- BARYTINE élixir minéral (3) : 10 gouttes au coucher
- TURQUOISE élixir minéral (3) : 10 gouttes au coucher.

Pour les séquelles de vaccinations multiples :

- AURICHALCITE élixir minéral (3) : 10 gouttes au coucher tous les 3 jours.
- PSORINUM 200K (5 - 7) : 3 doses à 15 jours d'intervalle.

Comment réabsorber un vaccin ?

L'ultime solution, lorsque pour des raisons de terrorisme administratif, on est obligé de passer à la vaccination :

LA MÉTHODE DU CATAPLASME D'ARGILE
Se présenter à la vaccination secrètement muni d'un tube d'argile (2), de gaze et d'un sparadrap collant (1). Aussitôt le vaccin instillé, passer aux toilettes et appliquer une bonne couche d'argile sur le vaccin. Le cataplasme est à laisser 2 heures environ. Le produit sera réabsorbé pratiquement en totalité.

Les multiples cas de bébés, enfants et animaux qui, sur mes conseils, ont pu bénéficier de cette astuce, n'ont eu aucune réaction de température, ni au niveau cutané. Ceux qui étaient hautement allergiques (risque d'œdème de Quincke) n'ont jamais eu la moindre réaction.

Ceci n'empêche pas de prendre en plus à la sortie de la VITAMINE C NATURELLE ou du CHLORURE DE MAGNÉSIUM.